

Informations à connaître avant d'utiliser le médicament

Que faire pendant et après votre traitement ?

Esmya® 5 mg comprimés

Carte patiente

Esmya peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde. Parmi ces effets indésirables, le médicament peut provoquer de graves lésions de votre foie.

Cette carte vous apporte des informations sur les analyses sanguines que vous devrez effectuer au cours du traitement, et sur ce que vous devez faire en cas de survenue d'effets indésirables affectant votre foie.

Ne prenez pas Esmya si vous présentez des problèmes hépatiques.

Informez votre médecin si vous avez connaissance de problèmes concernant le fonctionnement de votre foie ou avez des doutes ce sujet.

Effectuez des analyses sanguines régulièrement

Des analyses sanguines doivent être effectuées avant le début de chaque cure de traitement afin de déterminer si votre foie fonctionne correctement. En fonction des résultats de ces tests, le médecin décidera si un traitement par Esmya peut vous convenir ou non.

Pendant le traitement par Esmya, votre médecin effectuera des analyses sanguines régulièrement afin de contrôler votre fonction hépatique. Ces tests doivent être effectués chaque mois, ainsi que quelques semaines après la fin d'une cure de traitement (voir calendrier ci-dessous). Ces analyses sanguines indiqueront à votre médecin le fonctionnement de votre foie et sont essentielles pour la surveillance de votre traitement.

**Le tableau
ci-dessous vous
aidera à suivre
vos analyses
sanguines :**

	DATE
1 ^{er} TEST (avant le début du traitement)	
Début du traitement	
2 ^e TEST (4 semaines après le début du traitement)	
3 ^e TEST (8 semaines après le début du traitement)	
4 ^e TEST (12 semaines après le début du traitement)	
5 ^e TEST (2-4 semaines après la fin du traitement par Esmya)	

**Signes et symptômes
d'éventuels problèmes
hépatiques**

Interrompez le traitement et contactez un médecin immédiatement si vous observez l'un des signes ou des symptômes suivants :

- fatigue, épuisement sévère
- couleur jaune de la peau et des yeux
- urines de couleur foncé
- douleur dans la partie supérieure droite de l'abdomen
- démangeaisons
- nausées (mal de coeur)
- vomissements.

Le médecin devra contrôler le fonctionnement de votre foie immédiatement et décider si vous pouvez continuer le traitement.